



## Que faire si vous prenez un des 77 « médicaments sous surveillance » ?

L'AFSSAPS, accusée de laxisme à propos du Médiator®, a rendu publique le 31 janvier la liste des médicaments faisant l'objet d'une surveillance particulière. Si vous prenez un de ces médicaments, que faut-il craindre ? Que faut-il faire ?

- 1 - Le fait qu'un médicament soit sous surveillance n'a rien d'inquiétant : ils sont tous sous surveillance, c'est même une de leurs spécificités par rapport à d'autres produits que nous consommons.
- 2 - Tous les médicaments mis récemment sur le marché font l'objet d'une surveillance renforcée en France et en Europe.
- 3 - Certains médicaments sont mis sous surveillance en raison du comportement de certains consommateurs. Les enquêtes mises en place visent à évaluer l'ampleur des mésusages ou des détournements d'usage et leurs conséquences éventuelles. Si vous respectez les doses prescrites par votre médecin, vous n'avez rien à craindre de particulier.
- 4 - Une soixantaine de médicaments font l'objet d'une enquête parce qu'on les suspecte d'avoir parfois des effets néfastes. Suspect ne veut pas dire coupable : si vous consommez un de ces produits, ne modifiez pas votre consommation mais rappelez à votre médecin que vous en prenez et signalez-lui avec plus de soin que d'habitude « tout ce qui ne va pas ».

### Produits faisant l'objet de ce type d'enquête

ACLASTA®, ACTONEL®, ALLI®, ARCOXIA®, AREDIA®, ARIXTRA®, Bleu patente V®, BONVIVA®, BONDRONAT®, BYETTAS®, CHAMPIX®, CIMZIA®, CLASTOBAN®, CLODRONATE®, collyres utilisés pendant les examens du fond d'œil, COLOKIT®, CYMBALTA®, DESTARA®, DIDRONEL®, EFIENT®, EUCREAS®, FERISAT®, FONZYLANE®, fluoxétine, fluvoxamine, FOSAMAX®, FOSAVANCE®, FUANDATINE®, FURADOINE®, GALVUS®, GLIVEC®, HEXAQUINE®, ISENSTRESS®, Isotrétinoïne, JANUMET®, JANUVIAS®, KETUM®, LANTUS®, LIPIOCIS®, LYRICA®, MICRODOINE®, MULTAQ®, NEXEN®, NOCTRAN®, ORENCIA®, PARLODEL®, PEDEAS®, PHOLCODINE®, PRADAXAS®, PRAXINOR®, PRIMALAN®, PROTELOS®, PROTOPIC®, REVLIMID®, ROACTERMA®, ROHYPNOL®, sertraline, SKELID®, STABLON®, STILNOX®, TRIVASTAL®, TYSABRI®, Vaccins anti-hépatite B, VASTAREL®, VFEND®, VICTOZA®, XARELTOS®, ZOMETA®, ZYPADHERAS®, ZYBAN®, ZYVOXID®.

Sources : Open Rome et AFSSAPS <http://www.afssaps.fr>



## Le Dico du doc

### Publique

Adjectif féminin accolé au mot *santé* pour regrouper les méthodes et les actions visant à améliorer la santé d'une communauté ou de la population d'un pays.

Quand il est décliné au masculin et accolé au mot *secteur*, ce même adjectif regroupe les personnes dont la rémunération est financée par les impôts, en opposition au *secteur privé*, où les rémunérations sont financées par une activité marchande, qu'elle soit ou non à but lucratif (exemples : mutuelles, associations, fondations, firme pharmaceutique, médecin libéral, artisan, artiste...).

La santé publique est caractérisée par un dilemme : doit-elle ou non être confiée au seul secteur public ?

- Si OUI, est-ce démocratique de laisser 10% de la population fixer les choix sanitaires concernant l'ensemble de la collectivité ?
- Si NON, comment éviter que les poids lourds du secteur privé (firmes pharmaceutiques, par exemple) ne transforment la santé publique en stratégie de profit ?
- Si « ni OUI et ni NON », peut-on trouver un compromis entre ces extrêmes sans être accusé d'être compromis ?

Source : Open Rome

## Météo antibio

Risques

- Grippe élevé
- Bronchiolite en baisse
- Inf respiratoire élevé
- Gastro-entérite moyen
- Allergies pollens très faible

Source : <http://www.grog.org>  
et <http://www.pollens.fr>

### L'épidémie de grippe continue

Selon le Réseau des GROG, l'épidémie de grippe se poursuit en France. Plus de 5 millions de personnes ont déjà été atteintes cet hiver par les virus grippaux, mais les indicateurs semblent montrer un début de décline épidémique.

On note aussi un petit décalage chronologique entre le nord et le sud de la Loire. L'activité grippale est en baisse dans certaines régions de France Nord alors qu'elle continue d'augmenter en Languedoc-Roussillon, PACA et Rhône-Alpes.

Les virus grippaux A et B co-circulent toujours avec une dominance de la grippe B chez les enfants (principalement les 5-14 ans) et de la grippe A chez les patients de 15-64 ans.

Les bronchiolites du jeune enfant liées au VRS restent fréquentes.

Source : [www.grog.org](http://www.grog.org)