

Avez-vous un terrain favorisant le cancer du foie ?

Les cancers du foie surviennent quand le foie est devenu fibreux à cause d'une hépatite virale, d'une consommation excessive d'alcool ou d'une accumulation de graisse dans le foie.

Pour savoir si le foie était fibreux, les médecins n'avaient qu'une solution : aller en prélever un morceau et l'examiner au microscope. De récentes recherches permettent maintenant de détecter cette fibrose hépatique par une simple prise de sang dosant les transaminases, les gamma-GT, les plaquettes sanguines et la vitesse de la coagulation.

Un score peut être ainsi calculé de la façon suivante :

Item		Item		Item	
Age < 40 ans	0	Age ≥ 40 ans	3		
Femme	0	Homme	1		
Transaminases < 35 UI/l	0	Transaminases 35 - 69 UI/l	2	Transaminases ≥ 70 UI/l	4
Gamma-GT < 35 UI/l	0	Gamma-GT 35 - 89 UI/l	1	Gamma-GT ≥ 90 UI/l	2
Plaquettes ≥ 250 g/l	0	Plaquettes 170 - 249 g/l	1	Plaquettes < 170 g/l	4
Temps prothrombine ≤ 97%	0	Temps prothrombine 84-96%	2	Temps prothrombine < 84%	4

Si le total des points est supérieur à 8, le foie est probablement en train de devenir fibreux.

Dans ce cas, il faut consulter son médecin traitant, mesurer l'ampleur et chercher la cause de la fibrose hépatique, en soigner la cause et éviter la cancérisation.

Source: entretien avec le Dr Denis Ouzan (CHU Nice) le 21 février 2017

Le Dico du doc



Fourchette



Ustensile statistique déterminant la précision d'une estimation. Une fourchette se présente sous la forme de deux valeurs encadrant la valeur estimée.

Ex : « taille moyenne des joueurs de basket : 2,10 m (2,02 m - 2,16 m) ». La fourchette précise que la valeur moyenne mesurée chez l'échantillon de joueurs est 2,10 m, mais que la taille moyenne réelle de tous les joueurs est entre 2,02 m et 2,16 m. Connaître la fourchette est indispensable car, plus l'échantillon est petit, plus la taille de la fourchette augmente.

Les estimations statistiques qui ne donnent pas de fourchette sont ininterprétables. Les estimations des intentions de vote d'un échantillon d'électeurs en sont en bon exemple :

- candidat A : 22% des intentions de vote
- candidat B : 17% des intentions de vote

Si la fourchette est :

- candidat A (20% - 24%), candidat B (15% - 18%), il y a une différence entre les deux candidats
- candidat A (14% - 29%), candidat B (12% - 26%), les deux candidats sont au même niveau.

Source : Open Rome

Météo antibio

Risques

- Grippe en baisse
- Bronchiolite faible
- Inf respiratoire en baisse
- Gastro-entérite en baisse
- Allergie pollens en hausse

Sources : ECDC, Santé Publique France, Open Rome et RNSA

Europe : grippe et pollens

Grippe. En France et en Europe, la grippe circule toujours.

Pollens. Les pollens de cyprès sont très actifs sur tout le pourtour du bassin méditerranéen.

En France, se méfier aussi des pollens de noisetier, de frêne et d'aune.

Activité grippale en Europe - Source ECDC

