

Premiers cas de grippe en métropole

Un premier cas de grippe a été confirmé la semaine dernière chez un enfant âgé de 6 ans, résidant dans la communauté urbaine de Lyon et soigné par un médecin collaborant avec l'équipe lyonnaise du Centre national de référence pour la grippe et les virus respiratoires.

Cela montre que les virus grippaux ont commencé à circuler en métropole, provoquant quelques cas isolés. Il ne s'agit absolument pas d'une épidémie, mais d'un début de circulation virale préluant une épidémie qui peut survenir dans les prochains mois.

Cela rappelle aussi qu'il vaut mieux se faire vacciner contre la grippe dès maintenant, sans attendre l'épidémie, car plus on se vaccine tôt, mieux on est protégé :

- une protection partielle débute 9-10 jours après l'injection vaccinale,
- une protection suffisante apparaît 15 jours après l'injection,
- la protection augmente ensuite pendant les 4 mois suivants.

En France, le vaccin antigrippal est recommandé notamment pour :

- les femmes enceintes,
- les enfants et les adultes fragilisés par une maladie chronique,
- les adultes âgés de plus de 65 ans,
- l'entourage des nourrissons prématurés ou atteints d'une maladie congénitale,
- l'entourage des personnes immuno-déprimés,
- les soignants et tous ceux qui fréquentent des lieux de soins ou d'hébergement de personnes fragiles (EHPAD...),
- les professionnels du voyage.

Peuvent vacciner les médecins, les sages-femmes, les infirmières et les pharmaciens (les adultes uniquement).

Sources : Open Rome, Hospices Civils de Lyon, Université Lyon1, CNR grippe France, Santé publique France

Le Dico du doc



Vigie



Nom donné en Belgique aux soignants qui participent à la veille sanitaire en fournissant aux Autorités des données médicales et en effectuant des gestes techniques spécifiques (prélèvements, épreuves fonctionnelles, etc.).

Synonymes : centinela (Espagne), sentinelles et vigies GROG (France), watch docs (Afrique du Sud)...

Le recours aux soignants vigies a été inventé en Angleterre par le Royal College of General Practitioners (RCGP), perfectionné en France par les Groupes Régionaux d'Observation de la Grippe (GROG), puis étendu à toute l'Union Européenne par étapes successives (Eurosentinelles suivi d'EuroGrog puis du European Influenza Surveillance Network).

Les vigies constituent un échantillon d'observateurs. Quand une vigie détecte un cas, cela indique que plusieurs autres cas similaires existent dans la population.

Sources : Open Rome et European Influenza Surveillance Network (EISN)

Pour s'abonner : <https://openrome.org/abonnement/ddj>

Météo antibio


Risques

- Grippe très faible
- Bronchiolite très faible
- Inf respiratoire élevé
- Gastro-entérite en hausse
- Allergie pollens très faible

Sources : RNSA, Santé publique France

Plutôt calme

Niveau d'alerte régional pour la grippe
Semaine 42/2019



Source : analyse épidémiologique
des Cite - Auteurs : SpFrance - 2019

Source : Santé publique France