



# Nouvelle stratégie de vaccination de rappel dTcaPolio chez l'adulte : qu'en pensent les vaccinateurs ?

Anne Mosnier<sup>1</sup>, Isabelle Daviaud<sup>1</sup>, Béatrice Clairaz<sup>2</sup>, Didier Duhot<sup>3</sup>, Rachel Collignon-Portes<sup>3</sup>, Thierry Barthelme<sup>2</sup>, Jean Marie Cohen<sup>1</sup>, Philippe Boisnault<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Open Rome, 57 rue d'Amsterdam, 75008 Paris ; <sup>2</sup> SFSPo, 95 bis rue de Paris, 91570 Bièvres ; <sup>3</sup> SFMG, 141 av. de Verdun, 92130 Issy-les-Moulineaux

Contact : voir QR-code

## Introduction

Contexte évolutif récent de la vaccination de l'adulte contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la coqueluche (dTcaPolio) :

- ✓ Elargissement de la liste des professionnels de santé (PS) impliqués dans cette vaccination.
- ✓ Calendrier vaccinal 2022 : nouvelle recommandation introduisant la vaccination coqueluche au 2<sup>ème</sup> trimestre de la grossesse.
- ✓ Circulation limitée (au moment de l'étude) de l'information sur ces nouveautés auprès des différents PS vaccinateurs.

Le groupe COVIGIE a souhaité interroger un large panel de PS vaccinateurs sur leur perception de ces évolutions et sur leur pratique concernant la vaccination dTcaPolio chez l'adulte.

COVIGIE s'appuie sur une plateforme spécifique permettant aux PS de premier recours d'échanger autour de leurs expériences de terrain et de participer à des enquêtes express.

## Méthode

Enquête menée grâce au réseau de PS correspondants du groupe COVIGIE, principalement des médecins généralistes (MG) et des pharmaciens.

Cette enquête (26 questions) a été diffusée en ligne aux PS correspondants, du 28 septembre au 24 octobre 2022.

Des relances ont été régulièrement envoyées par mail.

La participation était anonyme.

Les analyses ont été réalisées avec Stata 11.2.

## Résultats

1 119 PS ont complété toutes les questions :

- 61% de MG et 32% de pharmaciens,
- 64% de femmes,
- 51% âgés de 40 à 60 ans.


A la fin octobre 2022, plus de 80% des MG et des pharmaciens déclarent avoir pris connaissance des nouvelles recommandations du calendrier vaccinal 2022

### MAIS

24% des MG et 33% des pharmaciens disent aussi ne pas connaître les nouvelles recommandations de vaccination coqueluche chez la femme enceinte.


93% des PS se sentent « tout à fait » (49%) ou « plutôt » (44%) à l'aise avec les recommandations vaccinales dTcaPolio (graph 1).

**Graph 1.** Vous sentez-vous à l'aise avec les recommandations vaccinales dTP ? (n=1 072)



Chez l'adulte, 3 situations de rappel semblent toutefois plus à problème pour les PS (graph 2) : évaluation du statut vaccinal des migrants, des situations de statut vaccinal inconnu et de rattrapage.

**Graph 2.** Y a-t-il une ou des situations qui peuvent vous poser problème en ce qui concerne la vaccination dTcaPolio ? (n=1 063)




Un consortium d'organisations non-gouvernementales de soins de premier recours, créé en 2020, au cours de la première vague de Covid-19. Une plateforme spécifique permettant aux soignants de premier recours de partager leur expérience et les signaux reflétant la réalité du terrain et pouvant aider à la prise de décision.

[www.covigie.org](http://www.covigie.org)

Au-delà du rappel dTcaPolio à 25 ans, la moitié des MG (52%) privilégient la vaccination avec la valence coqueluche lors des rappels de l'adulte, afin de protéger les nourrissons (82%) mais aussi les adultes directement (63%).

Cependant, l'application systématique de la nouvelle recommandation de vaccination coqueluche chez la femme enceinte ne paraît pas évidente (graph 3).

**Graph 3.** Selon vous, la nouvelle recommandation coqueluche pendant la grossesse vous paraît-elle applicable ? (n=1 026)



## Conclusion

Notre enquête Covigie pointe plusieurs pistes pouvant participer à améliorer la couverture vaccinale dTP/dTcaPolio des adultes :

- Renforcer et améliorer la communication par les autorités de santé des recommandations vaccinales, vers les professionnels de santé vaccinateurs (diffusion pro active et promotion des nouvelles versions du calendrier vaccinal ; information, formation, mise à disposition d'argumentaires validés et accompagnement des PS concernant ces recommandations).
- Renforcer et améliorer la communication auprès de la population.
- Mettre en place une traçabilité efficiente par un carnet de vaccination électronique et partagé entre la population et les PS (à inclure dans Mon espace santé).
- Associer systématiquement la valence coqueluche aux rappels dTP chez l'adulte, voire mettre à disposition un vaccin monovalent coqueluche.