

P-9 Stratégie de vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la coqueluche chez les adultes : qu'en pensent les vaccinateurs ?

Anne Mosnier¹, Isabelle Daviaud¹, Béatrice Clairaz², Didier Duhot³, Rachel Collignon-Portes³, Thierry Barthelme², Jean Marie Cohen¹, Philippe Boisnault³

¹ Open Rome, 57 rue d'Amsterdam, 75008 Paris ; ² SFSPPO, 95 bis rue de Paris, 91570 Bièvres ; ³ SFMG, 141 av. de Verdun, 92130 Issy-les-Moulineaux

Contact : amos@openrome.org

Introduction

Contexte évolutif récent de la vaccination dTcaP chez l'adulte :

- ✓ Elargissement de la liste des professionnels de santé (PS) impliqués dans cette vaccination.
- ✓ Calendrier vaccinal 2022 : nouvelle recommandation introduisant la vaccination coqueluche au 2^{ème} trimestre de la grossesse.
- ✓ Circulation limitée de l'information sur ces nouveautés auprès des différents PS vaccinateurs.

Le groupe COVIGIE a souhaité interroger un large panel de PS vaccinateurs sur leur perception des recommandations actuelles et sur leur pratique concernant la vaccination dTcaP chez les adultes.

COVIGIE s'appuie sur une plateforme spécifique permettant aux PS de premier recours d'échanger autour de leurs expériences de terrain et de participer à des enquêtes express.

Méthode

Notre enquête autour de la vaccination dTcaP chez les adultes a été menée grâce au réseau de PS correspondants du groupe COVIGIE, principalement des médecins généralistes (MG) et des pharmaciens.

Cette enquête (26 questions) a été diffusée en ligne aux PS, du 28 septembre au 24 octobre 2022.

Des relances ont été régulièrement envoyées par mail.

La participation était anonyme.


Les analyses ont été réalisées avec Stata 11.2.

Résultats

- 1 119 ont complété toutes les questions :
- 61% de MG et 32% de pharmaciens,
 - 64% de femmes,
 - 51% âgés de 40 à 60 ans.

A la fin octobre 2022, plus de 80% des MG et des pharmaciens déclarent avoir pris connaissance des nouvelles recommandations du calendrier vaccinal 2022 et 93% des PS se sentent « tout à fait » (49%) ou « plutôt » (44%) à l'aise avec les recommandations vaccinales dTP.


Graph 1. Vous sentez-vous à l'aise avec les recommandations vaccinales dTP ? (n=1 072)



MAIS 24% des MG et 33% des pharmaciens disent aussi ne pas connaître les nouvelles recommandations de vaccination coqueluche chez la femme enceinte.


Chez l'adulte, 3 situations de rappel semblent plus à problème pour les PS.

Graph 2. Y a-t-il une ou des situations qui peuvent vous poser problème en ce qui concerne la vaccination dTP ? (n=1 063)



L'application systématique de la nouvelle recommandation de vaccination coqueluche chez la femme enceinte ne paraît pas évidente.

Graph 3. Selon vous, la nouvelle recommandation coqueluche pendant la grossesse vous paraît-elle applicable ? (n=1 026)



Conclusion

Notre enquête Covigie pointe plusieurs pistes pouvant participer à améliorer la couverture vaccinale dTP/dTcaP des adultes :

- Renforcer la communication par les autorités de santé des recommandations vaccinales, vers les professionnels de santé vaccinateurs (diffusion pro active et promotion des nouvelles versions du calendrier vaccinal ; information, formation, mise à disposition d'argumentaires validés et accompagnement des PS concernant ces recommandations).
- Renforcer la communication auprès de la population.
- Mettre en place une traçabilité efficiente par un carnet de vaccination électronique et partagé entre la population et les PS (à inclure dans Mon espace santé).
- Associer systématiquement la valence coqueluche aux rappels dTP chez l'adulte, voire mettre à disposition un vaccin monovalent coqueluche.