

Vacciner contre la grippe saisonnière au temps du Covid-19

Anne Mosnier¹, Isabelle Daviaud¹, Béatrice Clairaz², Didier Duhot³, Rachel Collignon-Portes³, Thierry Barthelme², Jean Marie Cohen¹, Philippe Boisnault³

¹ Open Rome, 57 rue d'Amsterdam, 75008 Paris ; ² SFSP, 95 bis rue de Paris, 91570 Bièvres ; ³ SFMG, 141 av. de Verdun, 92130 Issy-les-Moulineaux

Contact : amos@openrome.org

Introduction



- Octobre 2021 : lancement par les autorités de santé de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2021-2022 en France.
- Contexte de cette campagne de vaccination :
 - ✓ Concomitance avec la campagne de rappel contre le Covid-19.
 - ✓ Modifications proposées par les autorités de santé : extension de la liste des vaccinateurs, période de priorisation pour les personnes ciblées par les recommandations, possible co-administration.
 - ✓ Disponibilité d'un vaccin antigrippal haute dose pour les 65 ans et +.

Le groupe COVIGIE a souhaité mener une enquête auprès d'un large panel de professionnels de santé (PS) sur leur expérience et leur perception des nouveautés de cette campagne de vaccination grippe, et de sa concomitance avec la campagne de vaccination Covid-19.

COVIGIE s'appuie sur une plateforme spécifique permettant aux PS de premier recours d'échanger autour de leurs expériences de terrain et de participer à des enquêtes express.

Méthode

Notre enquête, autour de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière dans le contexte de la campagne de rappels contre le Covid-19, a été menée grâce au réseau de PS correspondants du groupe COVIGIE, principalement des médecins généralistes (MG) et des pharmaciens.

Cette enquête (23 questions), diffusée en ligne, a été proposée aux PS, entre janvier et mars 2022 avec des relances régulières par mail.

La participation était anonyme.

Les analyses ont été réalisées avec Stata 11.2.

Résultats

1 101 vaccinateurs non hospitaliers ont cliqué sur le lien de l'enquête.

795 ont complété toutes les questions :


- 49% de MG et 41% de pharmaciens
- 61% de femmes
- 53% âgés de 40 à 60 ans
- eux-mêmes vaccinés contre la grippe (87%) et le Covid-19 (97%).

Plus de la moitié d'entre eux (**55%**) ont l'impression d'avoir vacciné contre la grippe moins de personnes qu'en 2020-21.

Cette impression est corroborée par les estimations Santé publique France de couverture vaccinale chez les personnes à risque ciblées par la vaccination : 52,6% en 2021-22 vs 55,8% l'année précédente.

Graph 1.

Par rapport à l'année dernière, avez-vous l'impression d'avoir vacciné contre la grippe (n=666) :



COVIGIE


Un consortium d'organisations non-gouvernementales de soins de premier recours, créé en 2020, au cours de la première vague de Covid-19.

Une plateforme spécifique permettant aux soignants de premier recours de partager leur expérience et les signaux reflétant la réalité du terrain et pouvant aider à la prise de décision.

www.covigie.org

La possibilité de la co-administration a été peu utilisée : seulement 41% des PS l'ont privilégiée.

Graph 2. Si vous vaccinez contre la grippe et le Covid-19 cet hiver, avez-vous privilégié (n=529) :



Le nouveau vaccin haute dose n'a été utilisé que par 19% des MG et 34% des pharmaciens.

Les principales causes de cette faible utilisation sont :

- pour les MG : les patients ne sont pas venus avec (67%), non connaissance du vaccin (36%) ;
- pour les pharmaciens : pas passé commande (72%), pas de prescription ou de recommandation du MG (67%).

Cependant, 88% des PS l'ayant proposé déclarent que leurs patients étaient d'accord pour être vaccinés avec ce nouveau vaccin, malgré parfois un peu de réticence.

Conclusion

Les PS de premier recours, principaux acteurs de la campagne de vaccination contre la grippe, semblent avoir mis en œuvre la plupart des nouvelles recommandations. Mais la connaissance et l'appropriation de ces nouveautés restent variables selon les PS, ce qui complexifie la coordination entre professionnels et pourrait limiter l'impact sur la couverture vaccinale de l'extension du nombre de vaccinateurs.

Une marge d'amélioration existe donc, principalement via plus d'informations concernant en particulier :

- la possible co-administration des vaccins antigrippaux et Covid-19,
- la proposition plus systématique de la vaccination aux personnes ciblées,
- la possibilité d'utiliser le vaccin haute dose contre la grippe pour les personnes de 65 ans et +.